

Interpretación de la Escala Finnegan:

Alteración SNC							
• Llanto agudo	2						
• Llanto agudo continuo	3						
• Duerme menos de 3 horas después de toma	1						
• Duerme menos de 2 horas después de toma	2						
• Duerme menos de 1 hora después de toma	3						
• Reflejo de Moro hiperactivo	2						
• Reflejo de Moro marcadamente hiperactivo	3						
• Temblores leves a la estimulación	1						
• Temblores moderados a la estimulación	2						
• Temblores leves espontáneos	3						
• Temblores moderados espontáneos	4						
• Hipertonía muscular	2						
• Escoriaciones	1						
• Mioclonías	3						
• Convulsiones generalizadas	5						
• Sudoración	1						
• Fiebre <38,4°C	1						
• Fiebre >38,4°C	2						
• Bostezos (>3-4 veces por Intervalo)	1						
• Erupciones cutáneas fugaces	1						
• Obstrucción nasal	1						
• Estornudos (>3-4 veces por intervalo)	1						
• Aleteo nasal	2						
• Frecuencia respiratoria >60x'	1						
• Dificultad respiratoria/tiraje	2						
• Succión Excesiva (con avidez)	1						
• Rechazo alimentario	2						
• Regurgitaciones	2						
• Vómitos intensos	3						
• Deposiciones disgregadas	2						
• Deposiciones líquidas	3						
TOTAL							

0-7: No Síndrome de Abstinencia.

8-12: Síndrome de Abstinencia Leve o Moderado.

13-16: Síndrome de Abstinencia Moderado – Severo.

>16: Síndrome de Abstinencia Severo.

La puntuación de 8 o superior, en tres valoraciones consecutivas, exige el tratamiento con opiáceos y depresores del SNC